

2 Annexe 2. Liste des espèces végétales contactées en 2019-2020

Tableau 186. Liste des espèces végétales observées en 2019-2020

| Nom latin | Nom français |
|---|--|
| <i>Acacia dealbata</i> Link, 1822 | Mimosa argenté, Mimosa des fleuristes, Mimosa de Bormes |
| <i>Acer campestre</i> L., 1753 | Erable champêtre, Acéraille |
| <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus |
| <i>Agrostis canina</i> L., 1753 | Agrostide des chiens |
| <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753 | Agrostide capillaire |
| <i>Agrostis curtisii</i> Kerguélen, 1976 | Agrostide à soie, Agrostis à soies |
| <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | Agrostide stolonifère |
| <i>Aira multivalvis</i> Dumort., 1824 | {Canche} |
| <i>Aira praecox</i> L., 1753 | Canche printanière |
| <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | Bugle rampante, Consyre moyenne |
| <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753 | Grand plantain d'eau, Plantain d'eau commun |
| <i>Allium vineale</i> L., 1753 | Ail des vignes, Oignon bâtard |
| <i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753 | Vulpin genouillé |
| <i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753 | Vulpin des prés |
| <i>Amaranthus blitum</i> subsp. <i>emarginatus</i> (Salzm. ex Uline & W.L.Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedrol, 1987 | Amarante échanquée |
| <i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | Orchis à fleurs lâches |
| <i>Andryala integrifolia</i> L., 1753 | Andryale à feuilles entières, Andryale à feuilles entières sinuose, Andryale sinuose |
| <i>Anisantha diandra</i> (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963 | Brome à deux étamines |
| <i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934 | Brome stérile |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | Flouve odorante |
| <i>Aphanes arvensis</i> L., 1753 | Alchémille des champs, Aphane des champs |
| <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842 | Arabette de thalium, Arabette des dames |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | Fromental élevé, Ray-grass français |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schmalzer & G.Martens, 1834 | Avoine à chapelets |
| <i>Asphodelus albus</i> Mill., 1768 | Asphodèle blanc, Bâton royal |
| <i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805 | Arroche hastée |
| <i>Avena fatua</i> L., 1753 | Avoine folle, Havenon |
| <i>Avena sativa</i> L., 1753 | Avoine cultivée |
| <i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer, 1838 | Foin tortueux |
| <i>Baldellia repens</i> (Lam.) Ooststr. ex Lawalrée, 1973 | |

| Nom latin | Nom français |
|---|---|
| <i>Barbarea vulgaris</i> W.T.Aiton, 1812 | Barbarée commune, Herbe de sainte Barbe |
| <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | Pâquerette |
| <i>Betonica officinalis</i> L., 1753 | Epiaire officinale |
| <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | Bouleau verruqueux |
| <i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791 | Bouleau blanc, Bouleau pubescent |
| <i>Bidens cernua</i> L., 1753 | Bident penché, Chanvre d'eau penché |
| <i>Bidens frondosa</i> L., 1753 | Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu |
| <i>Bidens tripartita</i> L., 1753 | Bident trifolié, Eupatoire aquatique |
| <i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817 | Brachypode des rochers |
| <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | Brachypode des bois, Brome des bois |
| <i>Briza minor</i> L., 1753 | Petite amourette, Brize mineure |
| <i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753 | Brome mou |
| <i>Bromus racemosus</i> L., 1762 | Brome en grappe |
| <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | Callune, Bérucée |
| <i>Campylopus introflexus</i> (Hedw.) Brid., 1819 | |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792 | Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin |
| <i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753 | Cardamine hérissée, Cresson de muraille |
| <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 | Cardamine des prés, Cresson des prés |
| <i>Carex binervis</i> Sm., 1800 | Laïche à deux nervures |
| <i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808 | Laïche vert jaunâtre |
| <i>Carex leporina</i> L., 1753 | Laïche Patte-de-lièvre, Laïche des lièvres |
| <i>Carex pilulifera</i> L., 1753 | Laïche à pilules |
| <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | Charme, Charmille |
| <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768 | Chataignier, Châtaignier commun |
| <i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799 | Centauree de Debeaux |
| <i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816 | Céraiste commune |
| <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799 | Céraiste aggloméré |
| <i>Ceratocarpus clavulata</i> (L.) Lidén, 1984 | Corydale à vrilles |
| <i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All., 1785 | Camomille romaine |
| <i>Chenopodium album</i> L., 1753 | Chénopode blanc, Senoussé |
| <i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800 | Cicendie filiforme |
| <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | Cirse des champs, Chardon des champs |
| <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768 | Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre |
| <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | Cirse des marais, Bâton du Diable |
| <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé |
| <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886 | Conopode dénudé, Grand Conopode |
| <i>Convallaria majalis</i> L., 1753 | Muguet, Clochette des bois |
| <i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753 | Liseron des champs, Vrillée |

| Nom latin | Nom français |
|---|---|
| <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | Noisetier, Avelinier |
| <i>Cotoneaster</i> Medik., 1789 sp. | |
| <i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl., 1903 | Crassule mousse, Mousse fleurie |
| <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | Aubépine à un style, Epine noire, Bois de mai |
| <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840 | Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires |
| <i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914 | Crépide à feuilles de pissenlit, Barkhausie à feuilles de Pissenlit |
| <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852 | Gaillet croisette, Croisette commune |
| <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753 | {Crételle} |
| <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822 | Genêt à balai, Juniesse |
| <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | Dactyle aggloméré, Pied-de-poule |
| <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 | Danthonie, Sieglingie retombante |
| <i>Daucus carota</i> L., 1753 | Carotte sauvage, Daucus carotte |
| <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Canche cespiteuse, Canche des champs |
| <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753 | Digitale pourpre, Gantelée |
| <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848 | Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée |
| <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834 | Fougère mâle |
| <i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818 | Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses |
| <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | Scirpe des marais |
| <i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753 | Epilobe à tige carrée, Epilobe à quatre angles |
| <i>Erica ciliaris</i> Loeffl. ex L., 1753 | Bruyère ciliée |
| <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | Bruyère cendrée, Bucane |
| <i>Erica scoparia</i> L., 1753 | Bruyère à balais |
| <i>Erica tetralix</i> L., 1753 | Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée |
| <i>Erigeron canadensis</i> L., 1753 | Conyze du Canada |
| <i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz, 1852 | Vesce hérissée, Ers velu |
| <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau |
| <i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779 | Fétuque hétérophylle |
| <i>Festuca rubra</i> L., 1753 | Fétuque rouge |
| <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | Bourgène |
| <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | Frêne élevé, Frêne commun |
| <i>Fumaria muralis</i> Sond. ex W.D.J.Koch, 1845 | Fumeterre des murs |
| <i>Fumaria officinalis</i> L., 1753 | Fumeterre officinale, Herbe à la veuve |
| <i>Galium aparine</i> L., 1753 | Gaillet gratteron, Herbe collante |
| <i>Galium elongatum</i> C.Presl, 1822 | Gaillet allongé |
| <i>Galium palustre</i> L., 1753 | Gaillet des marais |
| <i>Geranium dissectum</i> L., 1755 | Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées |
| <i>Geranium lucidum</i> L., 1753 | Géranium luisant |
| <i>Geranium molle</i> L., 1753 | Géranium à feuilles molles |

| Nom latin | Nom français |
|--|--|
| <i>Geranium purpureum</i> Vill., 1786 | Géranium pourpre |
| <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | Herbe à Robert |
| <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | Benoîte commune, Herbe de saint Benoît |
| <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre |
| <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | Glycérie flottante, Manne de Pologne |
| <i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753 | Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais |
| <i>Hedera helix</i> L., 1753 | Lierre grim pant, Herbe de saint Jean |
| <i>Helosciadium inundatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | Ache inondée, Céléri inondé |
| <i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | Ache nodiflore |
| <i>Hemerocallis</i> L., 1753 sp. | |
| <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce |
| <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | Houlque laineuse, Blanchard |
| <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | Ecuelle d'eau, Herbe aux Patagons |
| <i>Hypericum elodes</i> L., 1759 | Millepertuis des marais |
| <i>Hypericum humifusum</i> L., 1753 | Millepertuis couché, Petit Millepertuis |
| <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean |
| <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753 | Millepertuis élégant, Millepertuis joli |
| <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753 | Porcelle enracinée |
| <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Houx |
| <i>Illecebrum verticillatum</i> L., 1753 | Illécèbre verticillé |
| <i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | Scirpe flottant |
| <i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810 | Scirpe sétacé, Isolépis sétacé |
| <i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791 | Herbe de saint Jacques |
| <i>Jasione montana</i> L., 1753 | Jasione des montagnes, Herbe à midi |
| <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore |
| <i>Juncus articulatus</i> L., 1753 | Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants |
| <i>Juncus bufonius</i> L., 1753 | Jonc des crapauds |
| <i>Juncus bulbosus</i> L., 1753 | Jonc couché, Jonc bulbeux |
| <i>Juncus capitatus</i> Weigel, 1772 | Jonc à inflorescence globuleuse, Jonc capité, Jonc en tête |
| <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753 | Jonc aggloméré |
| <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Jonc épars, Jonc diffus |
| <i>Juncus heterophyllus</i> Dufour, 1825 | Jonc hétérophylle, Jonc à feuilles variées |
| <i>Juncus pygmaeus</i> Rich. ex Thuill., 1799 | Jonc nain |
| <i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort., 1827 | Linaire bâtarde, Velvete, Kickxia bâtarde |
| <i>Lactuca serriola</i> L., 1756 | Laitue scariole, Escarole |
| <i>Lamium purpureum</i> L., 1753 | Lamier pourpre, Ortie rouge |
| <i>Lapsana communis</i> L., 1753 | Lampsane commune, Graceline |
| <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | Gesse des prés |
| <i>Lemna gibba</i> L., 1753 | Lentille d'eau bossue, Canillée |

| Nom latin | Nom français |
|---|---|
| <i>Lemna minor</i> L., 1753 | Petite lentille d'eau |
| <i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816 | Lentille d'eau minuscule |
| <i>Lepidium didymum</i> L., 1767 | Corne-de-cerf didyme |
| <i>Lepidium squamatum</i> Forssk., 1775 | Corne-de-cerf écailleuse, Sénébière Corne-de-cerf |
| <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | Marguerite commune, Leucanthème commun |
| <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | Troà«ne, Raisin de chien |
| <i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768 | Linaire rampante |
| <i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768 | Linaire commune |
| <i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell., 1912 | Lin bisannuel |
| <i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864 | Littorelle à une fleur, Littorelle des étangs |
| <i>Lobelia urens</i> L., 1753 | Lobélie brûlante |
| <i>Lolium multiflorum</i> Lam., 1779 | Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie |
| <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | Ivraie vivace |
| <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | Chèvrefeuille des bois, Cranquillier |
| <i>Lotus angustissimus</i> L., 1753 | Lotier grêle, Lotier à gousses très étroites |
| <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée |
| <i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793 | Lotus des marais, Lotier des marais |
| <i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840 | Flûteau nageant, Alisma nageant |
| <i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805 | Luzule champêtre |
| <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811 | Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs |
| <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753 | Oeil-de-perdrix |
| <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | Lycopce d'Europe, Chanvre d'eau |
| <i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009 | Mouron rouge, Fausse Morgeline |
| <i>Lysimachia minima</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009 | Centenille naine |
| <i>Lysimachia tenella</i> L., 1753 | Mouron délicat |
| <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire |
| <i>Lythrum portula</i> (L.) D.A. Webb, 1967 | Pourpier d'eau |
| <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | Salicaire commune, Salicaire pourpre |
| <i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838 | Matricaire fausse-camomille, Matricaire discoà de |
| <i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762 | Luzerne tachetée |
| <i>Medicago sativa</i> subsp. <i>sativa</i> L., 1753 | Luzerne cultivée |
| <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille |
| <i>Mercurialis annua</i> L., 1753 | Mercuriale annuelle, Vignette |
| <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | Molinie bleue |
| <i>Montia arvensis</i> Wallr., 1840 | Montie à graines cartilagineuses |
| <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764 | Myosotis des champs |
| <i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797 | Myosotis bicolore, Myosotis changeant |

| Nom latin | Nom français |
|---|--|
| <i>Myosotis laxa</i> Lehm., 1818 | Myosotis cespiteux |
| <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753 | Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion |
| <i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753 | Myriophylle à épis |
| <i>Oenanthe crocata</i> L., 1753 | Oenanthe safranée |
| <i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich, 1776 | Oenanthe à feuilles de peucedan |
| <i>Oenanthe pimpinelloides</i> L., 1753 | Oenanthe faux boucage |
| <i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753 | Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat |
| <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | Osmonde royale, Fougère fleurie |
| <i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821 | Renouée Persicaire |
| <i>Phleum pratense</i> L., 1753 | Fléole des prés |
| <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | Roseau, Roseau commun, Roseau à balais |
| <i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 | Piloselle |
| <i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789 | Pin maritime, Pin mésogéen |
| <i>Pisum sativum</i> L., 1753 | Pois cultivé |
| <i>Plantago coronopus</i> L., 1753 | Plantain Corne-de-cerf, Plantain corne-de-bâ«uf, Pied-de-corbeau |
| <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures |
| <i>Plantago major</i> L., 1753 | Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet |
| <i>Poa annua</i> L., 1753 | Pâturin annuel |
| <i>Poa pratensis</i> L., 1753 | Pâturin des prés |
| <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | Pâturin commun, Gazon d'Angleterre |
| <i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797 | Polygala à feuilles de serpollet, Polygala couché |
| <i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 | Polygala commun, Polygala vulgaire |
| <i>Polygonum aviculare</i> L., 1753 | Renouée des oiseaux, Renouée Traînage |
| <i>Populus tremula</i> L., 1753 | Peuplier Tremble |
| <i>Potamogeton crispus</i> L., 1753 | Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues |
| <i>Potamogeton natans</i> L., 1753 | Potamot nageant |
| <i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788 | Potamot à feuilles de renouée |
| <i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schtdl., 1827 | Potamot filiforme |
| <i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch., 1797 | Potentille tormentille |
| <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | Potentille rampante, Quintefeuille |
| <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | Brunelle commune, Herbe au charpentier |
| <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | Merisier vrai, Cerisier des bois |
| <i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753 | Laurier-cerise, Laurier-palme |
| <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | Epine noire, Prunellier, Pelossier |
| <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Fougère aigle, Porte-aigle |
| <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | Pulicaire dysentérique |
| <i>Pyrus communis</i> subsp. <i>pyraster</i> (L.) Ehrh., 1780 | Poirier sauvage, Aigrin |
| <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784 | Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets |

| Nom latin | Nom français |
|---|--|
| <i>Quercus pyrenaica</i> Willd., 1805 | Chêne tauzin, Chêne-brosse |
| <i>Quercus robur</i> L., 1753 | Chêne pédonculé, Gravelin |
| <i>Quercus rubra</i> L., 1753 | Chêne rouge d'Amérique |
| <i>Radiola linoides</i> Roth, 1788 | Radiole faux-lin, Radiole, Faux lin |
| <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre |
| <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 | Renoncule bulbeuse |
| <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | Renoncule flammette, Petite douve, Flammule |
| <i>Ranunculus hederaceus</i> L., 1753 | Renoncule à feuilles de lierre, Renoncule lierre |
| <i>Ranunculus hederaceus</i> L., 1753 | Renoncule à feuilles de lierre, Renoncule lierre |
| <i>Ranunculus omiophyllus</i> Ten., 1830 | Grenouillette de Lenormand |
| <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | Renoncule rampante |
| <i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763 | Renoncule sarde, Sardonie |
| <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753 | Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri |
| <i>Raphanus raphanistrum</i> L., 1753 | Ravenelle, Radis sauvage |
| <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753 | Robinier faux-acacia, Carouge |
| <i>Rosa</i> L., 1753 sp. | |
| <i>Rubia peregrina</i> L., 1753 | Garance voyageuse, Petite garance |
| <i>Rubus</i> L., 1753 sp. | |
| <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | Oseille des prés, Rumex oseille |
| <i>Rumex acetosella</i> L., 1753 | Petite oseille, Oseille des brebis |
| <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770 | Patience agglomérée, Oseille agglomérée |
| <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | Patience crépue, Oseille crépue |
| <i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753 | Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage |
| <i>Rumex pulcher</i> L., 1753 | Patience élégante, Rumex joli |
| <i>Sagina procumbens</i> L., 1753 | Sagine couchée |
| <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804 | Saule à feuilles d'Olivier |
| <i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824 | Fétuque Roseau |
| <i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | Fétuque des prés |
| <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble |
| <i>Scorzoneroïdes autumnalis</i> (L.) Moench, 1794 | Liondent d'automne |
| <i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753 | Séneçon des bois, Séneçon des forêts |
| <i>Senecio vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> L., 1753 | Séneçon commun |
| <i>Sherardia arvensis</i> L., 1753 | Rubéole des champs, Gratteron fleuri |
| <i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 | Compagnon blanc, Silène des prés |
| <i>Simethis mattiazzii</i> (Vand.) G.López & Jarvis, 1984 | Simethis à feuilles aplaties, Siméthis de Mattiazzi |
| <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772 | Herbe aux chantres, Sisymbre officinal |
| <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | Douce amère, Bronde |

| Nom latin | Nom français |
|--|---|
| <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769 | Laiteron rude, Laiteron piquant |
| <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753 | Laiteron potager, Laiteron lisse |
| <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763 | |
| <i>Spergula arvensis</i> L., 1753 | Spergule des champs, Espargoutte des champs, Spargelle |
| <i>Spergula rubra</i> (L.) D.Dietr., 1840 | Sabline rouge |
| <i>Stachys arvensis</i> (L.) L., 1763 | Epière des champs |
| <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 | Epière des bois, Ortie à crapauds |
| <i>Stellaria graminea</i> L., 1753 | Stellaire graminée |
| <i>Stellaria holostea</i> L., 1753 | Stellaire holostée |
| <i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789 | Mouron des oiseaux, Morgeline |
| <i>Stuckenia pectinata</i> (L.) Bârlmer, 1912 | Potamot de Suisse |
| <i>Taraxacum</i> F.H.Wigg., 1780 sp. | |
| <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine |
| <i>Trifolium alexandrinum</i> L., 1755 | |
| <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794 | Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune |
| <i>Trifolium hybridum</i> L., 1753 | Trèfle hybride, Trèfle bâtard |
| <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | Trèfle des prés, Trèfle violet |
| <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande |
| <i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753 | Trèfle semeur, Trèfle souterrain, Trèfle enterreur |
| <i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip., 1844 | Matricaire inodore |
| <i>Trochardis verticillatum</i> (L.) Raf., 1840 | Carum verticillé |
| <i>Typha latifolia</i> L., 1753 | Massette à larges feuilles |
| <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier |
| <i>Ulex minor</i> Roth, 1797 | Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin |
| <i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948 | Nombriil de vénus, Oreille-d'abbé |
| <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | Ortie dioïque, Grande ortie |
| <i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810 | Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire |
| <i>Valerianaella locusta</i> (L.) Laterr., 1821 | Mache doucette, Mache |
| <i>Veronica arvensis</i> L., 1753 | Véronique des champs, Velvotte sauvage |
| <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753 | Véronique petit chêne, Fausse Germandrée |
| <i>Veronica officinalis</i> L., 1753 | Véronique officinale, Herbe aux ladres |
| <i>Veronica persica</i> Poir., 1808 | Véronique de Perse |
| <i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753 | Véronique à feuilles de serpolet |
| <i>Vicia angustifolia</i> L., 1759 | Vesce à feuilles étroites |
| <i>Vicia cracca</i> L., 1753 | Vesce cracca, Jarosse |
| <i>Vicia faba</i> L., 1753 | Vesce Fève |
| <i>Vicia sativa</i> L., 1753 | Vesce cultivée, Poisette |
| <i>Vicia segetalis</i> Thuill., 1799 | Vesce des moissons |
| <i>Viola arvensis</i> Murray, 1770 | Pensée des champs |

| Nom latin | Nom français |
|---|--|
| <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823 | Violette de Rivinus, Violette de rivin |
| <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821 | Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome |
| <i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel., 1805 | |